

# CARBAMAZEPINA

Es un anticonvulsivante, se utiliza en la neuralgia del trigémino y el trastorno bipolar

## GRAN MAL

Tónico-clónico generalizadas

CRISIS  
PARCIALES

Simple  
Complejas



Inicialmente

200 mg 12-24 h

Aumentar  
1-2 semanas

200-400 mg

Dosis máxima

1600 mg 24 h

## Epilepsia



Niños menores a 4 años

20-60 mg 24 h



Niños a partir de 4 años

100 mg 24 h



## Neuralgia trigeminal

200-400 mg

24 h



Incrementar dosis gradualmente hasta que desaparezca el dolor



100 mg

12 h

CATEGORÍA  
en embarazo

**D**

Existe evidencia de riesgo para el feto



## Trastorno bipolar

400 mg-600 mg

24 horas



Consulte a su médico si presenta:



Más crisis convulsivas



Diarrea, estreñimiento o malestar abdominal



Vértigo  
Náuseas  
Vómito  
Mareos



Va con mayor o menor frecuencia a orinar



Dolor muscular, de articulaciones o calambres



Somnolencia

Cambios repentinos de humor



Taquicardia, hipertensión arterial



Visión borrosa, visión doble o alucinaciones visuales



Vigilar hematocrito y enzimas hepáticas

Puede provocar Anemia Aplásica y Síndrome de Stevens Johnson



Contraindicado en pacientes con:

Depresión de la médula ósea  
Miastenia gravis  
Porfiria aguda intermitente  
Hipersensibilidad al fármaco

NO ADMINISTRAR JUNTO CON IMAO



Interacciones farmacológicas

Antidepresivos tricíclicos  
Anticoagulantes orales  
Anticonceptivos hormonales  
Corticosteroides  
Antipsicóticos

Yessenia Argentina Rojas Pérez | Luis Gerardo Balcázar Ochoa

powered by