

DULOXETINA

AUTORES

Dra. Marilyn Ibarra Uribe
Dra. Paulina Ulloa Camacho

—INDICACIONES—

Fibromialgia

(60 mg Día, iniciar con 30 mg por 6 meses)

Tratamiento de la Depresión Mayor

ACCIÓN

Incrementa los niveles extracelulares de la serotonina y norepinefrina en varias áreas del cerebro



PRESENTACIONES

Cápsulas de 30 mg (7 capsulas)
Cápsulas de 60 mg (14 y 28 cápsulas)



ALERTA

En Diabeticos empeora el control glicémico y pacientes con intolerancia a zucarosa
Provoca retención y vacilación urinal

CONTRAINDICACIONES

Alergia a la duloxetina
pacientes que reciben tratamiento con inhibidores de la MAO
glaucoma de angulo estrecho
menores de 18 años
Hipertención arterial no controlada

Dolor Crónico

Músculo Esquelético
- Dolor Lumbar Crónico
- Dolor por Osteoartritis
(60 mg Día, iniciar con 30 mg por 6 meses)



Tratamiento

de la Depresion Mayor
(60 mg Día, iniciar con 30 mg por 6 meses)

Potente Inhibidor Selectivo de la Recaptación de Serotonina Norepinefrina

Efectos Adversos

Naúseas, sequedad de boca, estreñimiento, diarrea, vomitos, cansancio, temblores, vision borrosa, perdida del apetito.



Trastorno

de Ansiedad Generalizada
(60 mg Día, iniciar con 30 mg por 6 meses)



Dolor Neuropático Periferico

de Origen Diabetes
(60 mg Día, iniciar con 30 mg por 6 meses)

POBLACIONES ESPECIALES

Personas con insuficiencia hepática
Pacientes con deterioro renal
Mujeres embarazadas
Mujeres lactando (no dar)



VIDA MEDIA

12 horas, en un rango de 8 y 17 horas
Concentraciones máximas en 8 horas

ALERTA

Cuando se administra junto con medicamento serotoninergicos presenta síndrome serotoninérgico (cambios en el estado mental, agitación, alucinaciones, coma)
Inestabilidad Autonómica (taquicardia, hipertensión) síntomas gastrointestinales (nauseas, vómito)

ADVERTENCIA

En algunos casos provoca agravamiento clínico y riesgo de suicidio mantener observación estrecha por los médicos y familiares.

NOTA Todos los pacientes que se tratan con antidepresivos por cualquier indicación, deben ser monitoreados cuidadosamente en caso de presentar empeoramiento clínico, tendencia al suicidio, cambios inusuales de comportamiento durante las primeras semanas del tratamiento.